

※肺痿肺癰欬嗽上氣病脈證并治 第七 147

厚朴麻黃湯方：厚朴_{五兩}麻黃_{四兩}石膏_{如雞子大}杏仁_{半升}半

夏_{半升}乾薑_{二兩}細辛_{二兩}小麥_{一升}五味子_{半升}。

上九味，以水一斗二升，先煮小麥熟，去滓，內諸藥，煮取三升，溫服一升，日三服。

澤漆湯方：半夏_{半升}紫參_{五兩，一作紫苑}澤漆_{三升，以東流水五斗}

煮，取一斗五升。生薑_{五兩}白前_{五兩}甘草、黃芩、人參、桂枝_{各三}

兩。

上九味，■咀，內澤漆汁中，煮取五升，溫服五合，至夜盡。

〔集解〕：

李翹曰：欬者，水寒射肺也。脈浮者，停水而又挾風以鼓之也。麻黃去風散肺逆，與半夏、細辛、乾薑、五味子、石膏同用，即前小青龍加石膏，為解表行水之劑也。然土能制水，而地道壅塞，則水亦不行，故用厚朴疏敦阜之土，使脾氣健運，而水自下泄矣。杏仁下氣去逆。小麥入心經，能通火氣，以火能生土，助脾而共成決水之功也。又云：脈沉為水，以澤漆為君者，因其功專於消痰行水也。水性陰寒，桂枝行陽氣以導之。然所以停水者，以脾土衰不能制水，肺氣逆不能通調水道，故用人參、紫參、白前、甘草補脾順肺，同為制水利水之方也。黃芩苦以泄之。半夏、生薑辛以散之也。

沈明宗曰：詳《金匱》欬嗽病，本於肺則一，大綱有三：一者，熱刑肺金，氣弱不振，欬而唾沫為肺痿；二者，風傷衛分，則病欬、上氣喘為肺脹。三者，邪傳榮血，凝而不行為肺癰。然肺脹之中，又分風、寒、表、裏、飲多風少、風多飲少之治。故氣喘而躁，脈浮者，為心下有水，欲作風水，當以小青龍兩解表裏，加石膏以清風熱。目如脫狀，乃風寒多而飲少，以越婢驅風加半夏而下痰逆。風寒外束，火熱內鬱，喉中水雞聲者，射干麻黃湯，宣通表裏之邪。風熱壅逆，津液不佈，化而為涎，時時唾濁，但坐不得眠者，皂莢丸以驅風鬱之涎。若欬而脈浮，邪居肺氣，以厚朴麻黃湯，俾從表解。欬而脈沉，邪入於榮，將成肺癰，以澤漆而破壅結。火逆上氣，咽喉不利，是無外邪，治當麥門冬湯，清

潤滋降。若見浮腫肩息，脈浮大而下利，真氣上浮下脫，則為不治。以上皆外邪兼內飲合病，微細之辨，臨證又當合《內經》五藏六府，互相傳乘之歟而辨之，則盡善矣。

無字圖譜

■咀

