

上腸胃道攝影檢查 UGI Series

[發表醫師] :護理指導 醫師(消化內科)

[發布日期] :2011/5/10

一.檢查目的(適應症)：

- 1.幫助診斷食道、胃及小腸結構和功能性的問題。
- 2.幫助診斷潰瘍、腫瘤、息肉、裂孔性脫疝、食道或幽門狹窄、食道靜脈曲張及胃、食道逆流及小腸上段的攝影。
- 3.觀察胃排空時間，藉由 X 光追蹤鋇劑通過速率，以助診斷蠕動障礙。

二.檢查注意事項：

1.檢查前：

(1).檢查前 1-2 天應吃清淡、低油脂、澱粉類的飲食（如：米飯、稀飯、饅頭、無顆粒果汁...等，以利腸胃道排空）。

(2).填寫特殊檢查同意書，且告知需有家屬陪同檢查。

(3).檢查前一晚午夜 12 時以後禁食(含飲料及開水)，或檢查前禁食 6-8 小時。

(4).檢查當天早上不可吃早餐(含開水)直到檢查完畢。

(5).若有活動假牙或鼻胃管需取下。

2.檢查中：

(1).檢查時，先注射腸胃道肌肉鬆弛劑（如有青光眼或攝護腺腫大者，不予注射）。

(2).您將吞服顯影劑(Barium Sulfate 約 60c.c.)，在 X 光檢查台上更換不同的姿勢，以利顯影劑可以到達上腸胃道的所有部位（食道、胃、十二指腸、小腸）。

(3).檢查過程約需 10-15 分鐘。

3.檢查後：

(1).檢查後可依醫師指示進食。

(2).檢查後必須多喝開水（視個人情況而定無限制多少），以利鋇劑排出。

(3).檢查後 2-3 天因顯影劑排泄，大便呈現白色屬正常現象，請勿驚慌。

(4).若 3 天內仍未解大便，應告知醫護人員，可視情況給予瀉劑或灌腸，以利顯影劑排出。

三、併發症：便秘、吸入性肺炎。

!!健康文章內文主要提供民眾降低對疾病因不了解產生之不安和恐懼，但不可取代實際的醫療行

為，所以身體如有不適請您前往醫院就醫治療。