

※黃疸病脈證并治_{第十六 356}

脈沉渴欲飲水，小便不利者，皆發黃。

〔註〕：

脈沉主裏也。渴欲飲水，熱瘀也。小便不利，濕鬱也。熱瘀濕鬱於裏，故發黃也。首條謂脈浮、緩、緊、數皆令發黃，是得於外因也。此條脈沉，亦令發黃，是得之於內因也，故治黃有汗、下二法也。

〔集註〕：

李彥曰：脈沉而渴，渴欲飲水，小便不利，則濕熱內蓄，無從分消，故發黃也。

※黃疸病脈證并治_{第十六 357}

疸而渴者，其疸難治，疸而不渴者，其疸可治。發

於陰部，其人必嘔，發於陽部，其人振寒而發熱也。

〔註〕：

未成疸前，小便不利而渴者，是欲作疸病也。已成疸後而渴者，是熱深不已，故難治也。不渴者，是熱淺將除，故可治也。疸發於陰者，人必嘔逆，嘔逆者，陰裏為之也；發於陽者，人必振寒發熱，寒熱者，陽表為之也。此以渴不渴，別疸之難治、可治；以嘔逆、寒熱，辨黃之在表在裏也。

〔集註〕：

程林曰：黃家以濕熱相搏，有口燥、鼻燥而未至於渴，渴則津液內消，邪氣獨勝，不渴則津液未竭，正氣未衰，治之所以分難易也。陰主裏，濕勝於裏則嘔；陽主表，熱勝於表，則振寒發熱也。此條辨疸證之渴與不渴，有輕重表裏之分也。

尤怡曰：疸而渴，則熱方熾而濕且日增，故難治。不渴則熱已減，而濕亦自消，故可治。陰部者，裏之藏府，關於氣故嘔；陽部者，表之軀殼，屬於形，故振寒而發熱，此陰陽、內外、淺深、微甚之辨也。