

<藥物效用>

治療排尿障礙之用藥

<服藥指示>

- 1.請依照醫師的指示服藥。
- 2.如果忘記服藥，請盡快服用；假如已接近下次服藥的時間，只要服用下次的用藥就好。不可一次服用兩次的藥量。
- 3.建議飯前一小時或餐後兩小時服用。

<注意事項>

- 1.若曾對此藥過敏者，請告知您的醫師或藥師。
- 2 若您有(或曾經有)甲狀腺機能亢進、胃潰瘍、支氣管氣喘、顯著性心跳徐緩或低血壓、冠狀動脈疾病、癲癇、帕金森氏症、胃腸道泌尿道阻塞、胃腸道發炎、肝臟疾病，或服用其他藥物，請主動告知您的醫師。
- 3.若您計畫(已)懷孕、哺乳，請告知您的醫(藥)師。

<副作用>

1. 每一種藥都有副作用，若有以下情況，請勿驚慌：腹部不適、臉部潮紅、出汗、噁心、嘔吐。
- 2.若上述症狀持續且加重，請立刻聯絡您的醫師。

健康文章內文主要提供民眾降低對疾病因不了解產生之不安和恐懼，但不可取代實際的醫療行為，所以身體如有不適請您前往醫院就醫治療。