

適應症：尋常性痤瘡

用法用量：每日兩次，將一層 Cleocin T Topical Solution 薄膜施於患部。包裝容器皆隨時保持緊閉。

使用說明：

1. 第一次使用時，先將原容器的蓋子取下丟棄，再將盒子內附之接頭的包裝拆開，用力按壓將接頭與瓶身組裝在一起（務必緊密接合，不可有縫隙）。
2. 將患部先清潔乾淨。
3. 旋開上方瓶蓋，將瓶身倒立，使藍色接頭部份完全浸潤到藥水，即可直接塗抹於患部。

副作用：

1. 接觸性皮膚炎
2. 刺激感（如紅疹、鱗屑剝落、與燒灼感）
3. 皮膚油膩
4. 革蘭氏陰性毛囊炎
5. 腹痛
6. 腸胃不適

注意事項：

1. Cleocin T Topical Solution 含有醇基劑，會引起眼燒灼感與刺激；若意外接觸敏感的體表（眼、擦傷的皮膚、黏膜），則以大量自來水沖洗；此溶液劑的味道不佳，於嘴巴周圍塗藥時尤需小心。
2. Cleocin T 需審慎處方用於異位性體質病人。
3. 除非有明確的需求，懷孕期間不可使用本劑。
4. 病人於用藥期間不可哺乳

保存方法：貯存於室溫（15°C~30°C），避免冰凍。

健康文章內文主要提供民眾降低對疾病因不了解產生之不安和恐懼，但不可取代實際的醫療行為，所以身體如有不適請您前往醫院就醫治療。