

※黃疸病脈證并治_{第十六 376}

酒黃疸，心中懊懣，或熱痛，梔子大黃湯主之。

〔註〕：

此詳申酒疸宜下之治也。酒黃疸，謂因飲酒過度而成黃疸也。心中懊懣欲吐，或自吐之而愈，或服梔子豉湯吐之而愈，皆可也。若心中懊懣不欲吐，或心中熱痛，皆非吐之可愈，故以梔子大黃湯下之愈也。

※黃疸病脈證并治_{第十六 377}

梔子大黃湯方：梔子_{十四枚} 大黃_{一兩} 枳實_{五枚} 豉_{一升}

上四味，以水六升，煮取三升，分溫二服。

〔集註〕：

魏荔彤曰：酒黃疸，心中懊懣或熱甚而痛，梔子大黃湯主之，蓋為實熱之邪立法也。酒家積鬱成熱，非此不除也。

※黃疸病脈證并治_{第十六 378}

酒疸下之，久久為黑疸，目青面黑，心中如噉蒜齏

狀，大便正黑，皮膚爪之不仁，其脈浮弱，雖黑微黃，

故知之。

〔註〕：

酒疸，心中懊懣，或心中熱痛，脈沉實者，當下之。若心中熱欲吐，脈浮弱者，當吐之，而反下之則為逆也。若其人素有勞倦，下之則熱入於脾，頃時腹滿如故，則成穀疸也。若其人素有女勞，下之則熱入於腎，雖黃微黑，久久必變為黑疸也。目青者，精傷也，面黑者腎傷也，心中如噉蒜齏狀胃傷也，大便黑色血傷也，皮膚不仁血痺也。此等證皆因酒疸脈浮弱者，應吐而反下之之誤使然也。

〔集註〕：

趙良曰：酒疸之黑，非女勞疸之黑也。蓋女勞之黑，腎氣所發也；酒疸之黑，敗血之黑也。因酒之濕熱傷脾胃，脾胃不和，陽氣不化，陰氣不運，若更下之，久久則運化之用愈耗矣。氣耗血積故腐瘀，濁色越出面為黑，味變於心咽作嘈雜，心辣如噉蒜齏狀。榮血衰而不行於皮膚，抓之不仁；輸於大腸，便如黑漆。其目青與脈浮脘皆血病也。

※黃疸病脈證并治_{第十六 379}

諸黃，豬膏髮煎主之。

〔按〕：

諸黃謂一切黃也，皆主豬膏髮煎，恐未必盡然。醫者審之，此必有脫簡也。

〔集註〕：

程林曰：扁鵲有《黃經》、《明堂》有烙三十六黃法，皆後人所未見，惟《聖濟總錄》載三十六黃，方論詳明，治法始備。今豬膏髮煎，能治諸黃，當是黃之輕者，可從小便而去，至若陰黃、急黃、女勞之屬，豈豬膏髮煎所能治乎？醫者審之。

※黃疸病脈證并治_{第十六 380}

豬膏髮煎方：豬膏 半斤 亂髮 三枚，如雞子大

上二味，和膏中煎之，髮消藥成，分再服，病從小便出。

※黃疸病脈證并治_{第十六 381}

諸黃，腹滿而嘔者，宜柴胡湯。

〔註〕：

嘔而腹痛，胃實熱也，然必有潮熱便硬，始宜大柴胡湯兩解之；若無潮熱便軟，則當用小柴胡湯去黃芩加芍藥和之可也。

〔集註〕：

程林曰：嘔而腹滿，視其前後，知何部不利，利之則愈。今黃家腹痛而嘔，應內有實邪，當是大柴胡湯以下之。若小柴胡，則可止嘔，未可療腹痛也。（胡柴湯方見寒疝嘔吐中）