

※婦科心法要訣產後門-方劑 1

血暈證治 清魂散

產後血暈惡露少，面脣色赤是停瘀，惡露去多脣面白，乃屬血脫不須疑，虛用清魂荊芥穗，人參芎草澤蘭隨，腹痛停瘀佛手散，醋漆薰法總相宜。

〔註〕：

產後血暈有因惡露去少，內有停瘀上攻迷暈者，面脣必赤色。有因去血過多，血脫而暈者，面脣必色白。

1. 血弱者，宜用清魂散。即荊芥穗、人參、川芎、甘草、澤蘭葉也。
2. 若停瘀腹痛者，用佛手散。
3. 二者俱宜頻燒乾漆，及用火燒鐵釘淬醋不時薰之。

※婦科心法要訣產後門-方劑 2

惡露不下證治 失笑散 聖愈湯

惡露不下是何因，風冷氣滯血瘀凝，若還不下因無血，面色黃白不脹疼，風冷血凝失笑散，去多聖愈補而行。

〔註〕：

產後惡露不下，有因風冷相干，氣滯血凝而不行者，必腹中脹痛。有因產時去血太多，無血不行者，面色必黃白，腹必不疼。以此辨之。

1. 血凝者，用失笑散，逐而行之。
2. 無血者，用聖愈湯，補而行之。

《失笑散、聖愈湯。方俱見首卷》

※婦科心法要訣產後門-方劑 3

惡露不下證治 十全大補湯 佛手散

惡露不絕傷任衝，不固時時淋漓行，或因虛損血不攝，或因瘀血腹中停，審色污淡臭腥穢，虛補實攻要辨明，虛用十全加膠續，瘀宜佛手補而行。

〔註〕：

產後惡露，乃裏兒污血，產時當隨胎而下。若日久不斷，時時淋漓者。或因衝任虛損，血不收攝。或因瘀行不盡，停留腹內，隨化隨行者。

當審其血之色，或污濁不明，或淺淡不鮮，或臭或腥或穢，辨其為實為虛而攻補之。

1. 虛宜十全大補湯，加阿膠、續斷。以補而固之。

2. 瘀宜佛手散，以補而行之。

《十全大補湯、佛手散。方俱見首卷》

※婦科心法要訣產後門-方劑 4

心胃痛證治 大巖蜜湯

心痛厥逆爪青白，寒凝大巖蜜溫行，四物去芍加獨活，薑桂茱萸草遠辛，因食惡食多嘔吐，麴麥香砂入二陳，大便燥結小便赤，兼熱飲冷玉燭攻。

〔註〕：

產後心胃痛，若四肢厥逆，爪甲青白，乃風冷寒凝，氣血滯澀，宜用大巖蜜湯溫以行之。即生地、當歸、赤芍、獨活、乾薑、桂心、吳茱萸、甘草、遠志、細辛也。

若因飲食停滯中脘作痛，必惡食嘔吐，宜二陳湯，加神麴、麥芽、木香、砂仁。

若大便結硬，小便赤澀，渴欲飲冷者，乃內有實熱也，宜玉燭散攻之。

《玉燭散方見首卷》

※婦科心法要訣產後門-方劑 5

腹痛證治 香桂散

去血過多血虛痛，去少壅瘀有餘疼，傷食惡食多脹

悶，寒入胞中見冷形，血虛當歸建中治，瘀壅失笑有

奇功，傷食異功加查麴，胞寒香桂桂歸芎。

〔註〕：

產後腹痛。若因去血過多而痛者，為血虛痛。若因惡露去少及瘀血壅滯而痛者，為有餘疼。若因傷食而痛者，必惡食脹悶。若因風寒乘虛入於胞中作痛者，必見冷痛形狀。

1. 血虛，宜當歸建中湯。
2. 血瘀，宜失笑散。
3. 傷食，宜異功散，加山查、神麴。
4. 胞寒，宜香桂散。即佛手散加桂心也。

《當歸建中湯、失笑散、異功散。方俱見首卷》