

※百合狐惑陰陽毒病脈證并治 第三 062

栝蒌牡蠣散方：栝樓根、牡蠣熬，等分。

上為細末，飲服方寸匕，日三服。

※百合狐惑陰陽毒病脈證并治 第三 063

百合病，發汗後者，百合知母湯主之。

〔註〕：

百合病不應汗而汗之，不解者，則致燥。以百合知母湯主之者，清而潤之也。

※百合狐惑陰陽毒病脈證并治 第三 064

百合知母湯方：百合七枚，擘 知母三兩，切。

上先以水洗百合，漬一宿，當白沫出，去其水，更以泉水二升，煎取一升，去滓；別以泉水二升，煎知母，取一升，去滓後合和，煎取一升五合，分溫再服。

※百合狐惑陰陽毒病脈證并治 第三 065

百合病，下之後者，滑石代赭湯主之。

〔註〕：

百合病不應下而下之，不解者，則怯中。以滑石代赭湯清而鎮之也。

※百合狐惑陰陽毒病脈證并治 第三 066

滑石代赭湯方：

百合 七枚，擘 滑石 三兩，碎，綿裹 代赭石 如彈丸大二枚，碎，綿裹。

上先以水洗百合，漬一宿，當白沫出，去其水，更以泉水二升，煎取一升，去滓；別以泉水二升，煎滑石、代赭，取一升，去滓後合和，重煎，取一升五合，分溫服。

※百合狐惑陰陽毒病脈證并治 第三 067

百合病，吐之後者，用後方主之。

〔註〕：

百合病不應吐而吐之，不解者，則虛中。以百合雞子湯清而補之也。

※百合狐惑陰陽毒病脈證并治 第三 068

百合雞子湯方：百合 七枚，擘 雞子黃 一枚。

上先以水洗百合，漬一宿，當白沫出，去其水，更以泉水二升，煎取一升，去滓，內雞子黃，攪勻，煎五分，溫服。