

<藥物效用>

本藥為利尿劑，用於治療高血壓、消除水腫。

<服藥指示>

1. 此藥通常是一天服用一次，儘可能保持每日於相同時間服藥，如果忘記服藥，請盡快服用。
2. 當您使用本藥來控制血壓時，請記得高血壓無法根治，因此當您自己覺得病情改善，也不可突然停藥，必須先請教您的醫師。

<注意事項>

1. 若您計畫(已)懷孕、哺乳或有肝、腎方面疾病、糖尿病、痛風、電解質不平衡等問題，請告知您的醫(藥)師。
2. 若您對本藥或磺胺類藥品過敏，請告知您的醫(藥)師。
3. 若您有使用其他藥品，特別是：毛地黃、含鋰藥物，請告知您的醫(藥)師。
4. 服用本藥可能產生頭暈現象，因此在變換姿勢時應放慢速度，以減輕此現象發生。此外，應盡量避免開車或操作危險機械。

<副作用>

1. 每一種藥都有副作用，若有以下情況，請勿太驚慌：姿勢性低血壓、胃腸不適、頭痛、頭暈、疲倦、潮紅等。這些症狀會隨時間慢慢減弱。
2. 上述症狀若持續且加重，或有下列少見的情形：皮膚紅疹、心悸、血管炎等。請立刻聯絡您的醫師。

健康文章內文主要提供民眾降低對疾病因不了解產生之不安和恐懼，但不可取代實際的醫療行為，所以身體如有不適請您前往醫院就醫治療。