

※瘡癰腸癰浸淫病脈證并治 第十八 454

薏苡附子敗醬散方：

薏苡仁 十分 附子 二分 敗醬 五分，一名苦菜

上三味，杵為末，取方寸匕，以水二升，煎減半，頓服，小便當下。

〔集解〕：

徐彬曰：薏苡寒能除熱，兼下氣勝濕，利腸胃，破毒腫，敗醬善排膿破血，利結熱毒氣，故以為臣，附子導熱行結，故為反佐。

※瘡癰腸癰浸淫病脈證并治 第十八 455

腸癰者，少腹腫痞，按之即痛，如淋，小便自調，

時時發熱，自汗出，復惡寒。其脈遲緊者，膿未成，

可下之，當有血；脈洪數者，膿已成，不可下也，大

黃牡丹湯主之。

〔註〕：

此承上條，詳發其證，以明其治也。腸癰者，其證則少腹腫硬，按之即痛，可知癰在內也；溺時如淋，尿色自調，可知腫礙之也。時時發熱，汗出惡寒，似有表病，而實非表病也。其脈遲緊，則陰盛血未化，其膿未成，可下之，大便當有血也。若其脈洪數，則陽盛血已腐，其膿已成，不可下也。下之以大黃牡丹湯，消瘀瀉熱也。

※瘡癰腸癰浸淫病脈證并治 第十八 456

大黃牡丹湯方：大黃 四兩 牡丹 一兩 桃仁 五十箇 芒硝 三合

瓜子 半升

上五味，以水六升，煮取一升，去滓，內芒硝再煎沸，頓服之。有膿當下，如無膿當下血。

〔集解〕：

李杲曰：大黃、芒硝泄熱，桃仁行瘀，丹皮逐血痺，去血分中伏火，瓜子主潰膿血。

※瘡癰腸癰浸淫病脈證并治 第十八 457

問曰：寸口脈微而濇，法當亡血，若汗出。設不汗

者云何？答曰：若身有瘡，被刀斧所傷，亡血故也。

〔註〕：

脈微氣奪也，脈濇血奪也，故曰：法當亡血汗出也。設無亡血汗出等病，則必身有瘡被刀斧所傷，亡血故也。

〔集註〕：

李杲曰：汗出亡陽，則脈微；亡血傷陰，則脈濇。微與濇皆陰脈也，設不汗而瘡瘍金瘡，雖不亡陽而

※瘡癰腸癰浸淫病脈證并治 第十八 458

病金瘡，王不留行散主之。

〔註〕：

此承上條以明其治也。金瘡，謂刀斧所傷之瘡也，亡血過多，經絡血虛，風寒易得干之，故用王不留行散，一以止血出，一以防外邪也。小瘡粉之，即外敷也。