

## ※辨陽明病脈證并治-湯劑 5

### 調胃承氣湯方

**大黃** 四兩，去皮，酒浸 **甘草** 二兩，炙 **芒硝** 半升。

上三味，以水三升，煮取一升，去滓，內芒硝，更煮兩沸，少少溫服之。

〔方解〕：

方名調胃承氣者，有調和承順胃氣之義，非若大、小承氣專攻下也。經曰：熱淫於內，治以鹹寒；火淫於內，治以苦寒。君大黃之苦寒，臣芒硝之鹹寒，二味並舉，攻熱瀉火之力備矣。恐其速下，故佐甘草之緩。又恐其過下，故少少溫服之，其意在不峻而和也。

## ※辨陽明病脈證并治-湯劑 6

### 大承氣湯方

**大黃** 四兩，酒洗 **厚朴** 半斤，炙，去皮 **枳實** 五枚，炙 **芒硝** 三合。

上四味，以水一斗，先煮二物，取五升，去滓，內大黃更煮，取二升，去滓，內芒硝，更上微火一兩沸，分溫再服。得下，餘勿服。

〔方解〕：

諸積熱結於裏而成滿、痞、燥、實者，均以大承氣湯下之也。

1. 滿者，腹脅滿急■脹，故用厚朴以消氣壅。
2. 痞者，心下痞塞硬堅，故用枳實以破氣結。
3. 燥者，腸中燥屎乾結，故用芒硝潤燥軟堅。
4. 實者，腹痛、大便不通，故用大黃攻積瀉熱。然必審四證之輕重，四藥之多少，適其宜，始可與也。若邪重劑輕，則邪氣不服；邪輕劑重，則正氣轉傷，不可不慎也。

〔集解〕：

柯琴曰：諸病皆因於氣，穢物之不去，由於氣之不順也，故攻積之劑，必用氣分之藥，因以承氣名湯。方分大小有二義焉。

1. 厚朴倍大黃，是氣藥為君，名大承氣。
2. 大黃倍厚朴，是氣藥為臣，名小承氣。
3. 味多、性猛、制大其服，欲令大瀉下也，因名曰大。
4. 味寡、性緩、制小其服，欲微和胃氣也，因名曰小。

且煎法更有妙義。大承氣用水一斗煮朴、枳，取五升，去滓；內大黃，再煮取二升；內芒硝，何哉？蓋生者氣銳而先行，熟者氣純而和緩。仲景欲使芒硝先化燥屎，大黃繼通地道，而後枳、朴除其痞滿。若小承氣，以三味同煎，不分次第。同一大黃，而煎法不同，此可見仲景微和之意也。

程知曰：調胃承氣，大黃用酒浸；大承氣，大黃用酒洗；皆為芒硝之鹹寒而以酒制之。若小承氣不用芒硝，則亦不事酒浸洗矣。

## ※辨陽明病脈證并治-湯劑 7

### 蜜煎導方

蜜七合，一味內銅器中，微火煎之，稍凝似飴狀，

攪之勿令焦著，欲可丸，併手捻作挺子，令頭銳大如

指，長二寸許，當熱時急作，冷則硬。以內穀道中，

以手急抱，欲大便時乃去之。

《內臺方》用蜜五合，煎凝時，加皂角末五錢，蘸捻作挺，以豬膽汁或油潤穀道，內之。

### 豬膽汁方

大豬膽一枚，瀉汁和法醋少許，以灌穀道內，如一

食頃，當大便，出宿食惡物甚效。

《內臺方》不用醋，以小竹管插入膽口，留一頭用油潤，內入穀道中，以手將膽捻之，其汁自入內，此方用之甚便。

## 土瓜根方。缺。

〔按〕：

土瓜，即俗名赤雹也。《肘後方》治大便不通，採根搗汁，用筒吹入肛門內，此與上豬膽汁方同義。

《內臺方》用土瓜根削如挺，內入穀道中，誤矣。

蓋蜜挺入穀道能烊化而潤大便，土瓜根不能烊化，如削挺用之，恐失仲景製方之義。

## ※辨陽明病脈證并治-湯劑 8

### 豬苓湯方

豬苓<sub>去皮</sub> 茯苓、阿膠、澤瀉、滑石 各一兩，碎。

以上五味，以水四升，先煮四味，取二升，去滓，內阿膠烊消，溫服七合，日三服。

〔集解〕：

趙羽皇曰：仲景製豬苓一湯，以行陽明、少陰二經水熱。然其旨全在益陰，不專利水。蓋傷寒表虛，最忌亡陽；而裏虛又患亡陰。亡陰者，亡腎中之陰，與胃家之津液也。故陰虛之人，不但大便不可輕動，即小便亦忌下通，倘陰虛過於滲利，則津液反致耗竭。方中阿膠質膏，養陰而滋燥；滑石性滑，去熱而利水；佐以二苓之滲瀉，既疏濁熱而不留其壅滯，亦潤真陰而不苦其枯燥，是利水而不傷陰之善劑也。故利水之法，於太陽用五苓者，以太陽職司寒水，故加桂以溫之，是煖腎以行水也。於陽明、少陰用豬苓者，以二經兩關津液，特用阿膠、滑石以潤之，是滋養無形以行有形也。利水雖同，寒溫迥別，惟明者知之。