

<藥物效用>

增加腸蠕動與促進液體蓄積於大腸而產生緩瀉作用；用在緩解便秘。

<服藥指示>

- 1.一般建議空腹服用，並搭配一杯水來幫助吞服此藥。
- 2.服用時若對此藥的味道感到不適時，可搭配一些果汁或碳酸飲料。
- 3.服用後通常約 6~8 小時會產生緩瀉的藥效，因此多為晚上或睡前服用。
- 4.請務必按時服藥，忘記服藥當想起時，請盡快補服，下次就恢復正常的時間服藥；若已接近下次服藥時間，只要服用下次的藥。不可一次服用兩次的藥量。

<注意事項>

- 1.本品為油脂，會延緩胃排空時間，空腹服用，效果更好。
- 2.長期使用此藥會使您對瀉劑產生依賴，使腸道失去正常的蠕動能力。因此除非有醫生處方或特別交代，否則此藥不宜長期連續的使用。

<副作用>

若出現不明原因腸道過度活動(如：腹絞痛、腹瀉)，應該停止使用此藥，若症狀持續沒有改善，請聯絡醫生。

健康文章內文主要提供民眾降低對疾病因不了解產生之不安和恐懼，但不可取代實際的醫療行為，所以身體如有不適請您前往醫院就醫治療。