

※辨陽明病脈證并治-條文 37

陽明病，下之，其外有熱，手足溫，不結胸，心中

懊懣，饑不能食，但頭汗出者，梔子豉湯主之。

〔註〕：

明經經病下之，身熱未除，手足溫，不結胸者，是所陷之邪淺也。心中懊懣，饑不能食，但頭汗出者，是陽邪蒸鬱於胸膈間也。故宜梔子豉湯，涌其熱也。

〔集註〕：

程知曰：其外有熱者，經邪未解也。手足溫者，熱入未深也。

程應旂曰：懊懣擾胃，故饑不能食；熱鬱氣蒸，故但頭汗出。

魏荔彤曰：表邪未全入裏，乃即以為胃實而遽下之，則其外仍有熱，究不能隨下藥而蕩滌也。於是雖熱而不潮，手足雖溫而無濇然之汗出，則是在表者；仍在表而下之，徒傷其裏耳；即不至於全在太陽者，誤下成結胸，而心下懊懣，饑不能食，但頭汗出，其陽明蒸蒸之熱，為陰寒之藥所鬱，俱凝塞於胸膈之上，其證已昭然矣。但病仍帶表，既不可再下，且已入裏，又不可復發汗，惟有主以梔子豉湯，仍從太陽治也。

※辨陽明病脈證并治-條文 38

傷寒嘔多，雖有陽明證，不可攻之。

〔註〕：

傷寒三陽多有嘔證，以其風寒之表未除，胸中陽氣為寒所鬱，故皆不可攻下也。其乾嘔而惡寒發熱者，屬太陽也。喜嘔而寒熱往來者，屬少陽也。今雖祇有惡熱、不惡寒，大便硬之陽明證，而嘔多亦不可攻之，其氣逆在上而未斂為實也。

〔集註〕：

沈明宗曰：惡寒、發熱之嘔屬太陽；寒熱往來之嘔屬少陽；但惡熱、不惡寒之嘔屬陽明。然嘔多則氣已上逆，邪氣偏侵上脘，或帶少陽，故雖有陽明證，慎不可攻也。

※辨陽明病脈證并治-條文 39

陽明中風，口苦咽乾，腹滿微喘，發熱惡寒，脈浮

而緊，若下之，則腹滿小便難也。

〔註〕：

陽明，謂陽明裏證。中風，謂太陽表證也。口苦咽乾，少陽熱證也；腹滿，陽明熱證也；微喘、發熱惡寒，太陽傷寒證也；脈浮而緊，傷寒脈也。此為風寒兼傷，表裏同病之證。當審表裏施治。太陽、陽明病多，則以桂枝加大黃湯兩解之。少陽、陽明病多，則以大柴胡湯和而下之。若惟從裏治，而遽以腹滿一證，為熱入陽明而下之，則表邪乘虛復陷，故腹更滿也。裏熱愈竭其液，故小便難也。

〔集註〕：

程知曰：此言陽明兼有太陽、少陽表邪，即不可攻也。陽明中風，熱邪也。腹滿而喘，熱入裏矣。然喘而微，則未全入裏也。發熱惡寒，脈浮而緊，皆太陽未除之證。口苦咽乾，為有少陽之半表半裏。若誤下之，則表邪乘虛內陷，而腹益滿矣。兼以重亡津液，故小便難也。

程應旄曰：此條與太陽大青龍證同。太陽以風寒持其榮衛，故有煩躁證而無腹滿證；此以風寒持住陽明，故有腹滿證而無煩躁證。然口苦咽乾，實與煩躁同其機兆也。

※辨陽明病脈證并治-條文 40

陽明病，脈浮而緊，咽燥口苦，腹滿而喘，發熱汗

出，不惡寒、反惡熱，身重。若發汗則躁，心憤憤反

譫語；若加溫鍼，必怵惕煩躁不得眠；若下之，則胃

中空虛，客氣動膈，心中懊懣，舌上胎者，梔子豉湯

主之。

若渴欲飲水，口乾舌燥者，白虎加人參湯主之。若

脈浮發熱，渴欲飲水，小便不利者，豬苓湯主之。陽

明病，汗出多而渴者，不可與豬苓湯，以汗多胃中燥，

豬苓湯復利其小便故也。

〔註〕：

此承前條互發其義，以明其治也。前條表證居多，戒不可誤下；此條表裏混淆，脈證錯雜，不但不可誤下，亦不可誤汗也。若以脈浮而緊，誤發其汗，則奪液傷陰。或加燒鍼，必益助陽邪，故譫語煩躁，怵惕憤亂不眠也。或以證之腹滿、惡熱而誤下之，則胃中空虛，客氣邪熱擾動胸膈，心中懊惱，舌上生胎，是皆誤下之過，宜以梔子豉湯一涌而可安也。

若脈浮不緊，證無懊惱，惟發熱，渴欲飲水，口乾舌燥者，為太陽表邪已衰，陽明燥熱正甚，宜白虎加人參湯，滋液以生津。若發熱渴欲飲水，小便不利者，是陽明飲、熱並盛，宜豬苓湯，利水以滋乾。然陽明病，法當多汗，因汗出多致小便少而渴者，不可與豬苓湯。蓋以汗多胃燥，無水不能下行，乃水涸之小便少，非水蓄之小便不利也。恐豬苓湯更利其小便，則益竭津液而助燥矣。

〔按〕：

太陽病，煩熱無汗而渴，小便利者，大青龍湯證也；小便不利者，小青龍湯去半夏加花粉、茯苓證也。太陽病，煩熱有汗而渴，小便利者，桂枝合白虎湯證也；小便不利者，五苓散證。

陽明病，煩熱無汗而渴，小便利者，宜葛根湯加石膏主之；小便不利者，以五苓散加石膏、寒水石、滑石主之。陽明病，煩熱有汗而渴，小便利者，宜白虎湯；小便不利者，以豬苓湯。

少陽病，寒熱無汗而渴，小便利者，當以小柴胡湯去半夏加花粉；小便不利者，當以小柴胡湯加茯苓。

太陰無渴。

少陰陽邪，煩嘔、小便赤而渴者，以豬苓湯。少陰陰邪，下利、下便白而渴者，以真武湯。

厥陰陽邪，消渴者，白虎加人參湯。厥陰陰邪，轉屬陽明，渴欲飲水者，少少與之則愈。證既不同，法亦各異，當詳審而明辨之。

〔集註〕：

喻昌曰：發熱以上與前條同，而汗出、不惡寒、反惡熱、身重四者，皆陽明之見證，所以汗、下、燒鍼俱不可用。舌上胎，則膈熱甚，故湧以梔子豉，而徹去其膈熱，斯治太陽而無礙陽明矣。若前證更加口乾舌燥，則宜用白虎湯以解熱生津。更加小便不利，則宜以豬苓湯以導熱滋乾也。其汗多而渴，不可與豬苓湯者，以熱邪傳入陽明，必先耗其津液，加以汗多復奪之於外，又利小便更奪之於下，則津液有立亡之患，故示戒也。

程應旆曰：熱在上焦，故用梔子豉湯；熱在中焦，故用白虎加人參湯；熱在下焦，故用豬苓湯。

※辨陽明病脈證并治-條文 41

脈浮而大，心下反硬，有熱。屬藏者，攻之，不令

發汗；屬府者，不令洩數。洩數則大便硬，汗多則熱

愈，汗少則便難，脈遲尚未可攻。

〔註〕：

屬藏，謂屬裏也；屬府，謂屬表也。洩，謂小便也。脈浮而大，太陽、陽明脈也。浮屬表，大屬裏。今太陽脈浮之表未解，而心下反硬，陽明之裏又急，權乎汗、下可也。設裏有熱實，攻之無疑，不須先汗以解外也。如無熱實，而有脈浮之表，不但不令攻之，即小便不利，亦不令利小便，仍當解外也。蓋恐洩數汗多，亡其津液，致大便硬，則熱愈實也。若汗少、脈遲，即有便硬，裏尚未實，亦未可攻也。

〔集註〕：

王肯堂曰：論言脈浮大，反發汗、反下之為逆。此以心下硬有熱，知傳邪入裏，故舍脈而從證也。大便則許攻之，小便則不許利，何也？曰：攻大便則內熱除，利小便則津液傷也。

林瀾曰：心下硬與腹硬滿不同。腹硬，邪已結聚成實，此但在心下，自與非下不可者異矣。腑與臟對舉而言，見一為入裏，一猶屬表之義也。

※辨陽明病脈證并治-條文 42

陽明病，脈遲，食難用飽，飽則微煩、頭眩，必小

便難，此欲作穀疸。雖下之腹滿如故，所以然者，脈

遲故也。

〔註〕：

陽明病，不更衣，已食如饑，食輒腹滿、脈數者，則為胃熱，可下證也。今脈遲，遲為中寒，中寒不能化穀，所以雖饑欲食，食難用飽，飽則煩悶，是健運失度也。清者阻於上升，故頭眩；濁者阻於下降，故小便難。食鬱濕瘀，此欲作穀疸之徵，非陽明熱濕腹滿、發黃者比。雖下之，腹滿暫減，頃復如故，所以然者，脈遲中寒故也。

〔集註〕：

方有執曰：遲為寒不化穀，故食難用飽。濕鬱而蒸，氣逆而不下行，故微煩、頭眩，小便難也。疸，黃病也。穀疸，水穀之濕蒸發而身黃也。

張璐曰：下之腹滿如故，蓋腹滿已是邪陷，脈遲則胃不實，徒下其糟粕，病既不除而反害之耳。夫陽明證本當下，陽明而至腹痛，尤當急下。獨此一證下之，腹滿必如故者，緣脈遲則胃氣空虛，津液不充，其滿不過虛熱內壅，非結熱當下之比也。可見脈遲胃虛，不但下之無益，即發汗利小便之法，亦不可用，惟當用和法，如甘草乾薑湯，先溫其中，然後少與調胃，微和胃氣可也。

程應旂曰：熱畜成黃之腹滿，下之可去；此則穀氣不得宣洩，屬胃氣虛寒使然，下之益虛其虛矣。故腹滿如故。