

<藥物效用>

用於解除氣喘發作及慢性支氣管炎之支氣管平滑肌痙攣，使呼吸道順暢。

<服藥指示>

- 1.請您依照醫師指示的劑量耐心使用，請勿自行改變用量或用藥時間。
- 2.忘記服藥請盡快服用；若已接近下次服藥時間，只要服用下次的藥。不可一次服用兩次的藥量。

<注意事項>

- 1.若您有心臟病、高血壓、甲狀腺機能亢進、癲癇、糖尿病，請告知您的醫(藥)師。
- 2.喝茶、咖啡、可樂，及抽煙會影響茶鹼的作用，當使用習慣改變時，請告知您的醫(藥)師。
- 3.若您對 Formoterol Fumarate 或其他藥物過敏，請告知您的醫(藥)師。
- 4.服用此藥時，應該主動告知您的醫(藥)師所有您同時服用的其他藥品；特別是治療氣喘、感冒藥、降血壓藥（乙型交感神經阻斷劑）等。
- 5.若痰變稠或呈黃色，應盡快告知醫師，以確定是否有感染。

<副作用>

- 1.如果您有手抖、心悸、興奮、失眠、噁心等，症狀嚴重且持續時，請立即聯絡您的醫師。

健康文章內文主要提供民眾降低對疾病因不了解產生之不安和恐懼，但不可取代實際的醫療行為，所以身體如有不適請您前往醫院就醫治療。