

便治爾錠®錠 Bentyt® 10mg

藥品成分名：Dicyclomine HCl

藥品外觀：白色，圓扁形，錠劑；大小：0.7 公分；標記：[10]

作用

便治爾錠®錠用於緩解平滑肌之痙攣，膽石症及膽囊炎發生之疝痛；輸尿管之痙攣。

用法

- 1.盡量在每日同一時間服藥。
- 2.請依藥袋指示服用或按照醫師的指示服用。

注意事項

- 1.若您計畫（已）懷孕、哺乳，或者是有肝、腎、心臟疾病，應告知您的醫生及藥師。
- 2.若有前列腺肥大、閉尿、幽門狹窄者請告知您的醫生及藥師。
- 3.小於六個月之新生兒請勿投與此藥。
- 4.青光眼之患者，如有必要時請詳予診察，審慎投與。
- 5.此藥物會使始人思睡及視力模糊，患者避免從事需精神集中或視力敏銳之工作，請小心行動，以避免發生跌倒意外造成危險。尤其是老年人，請

特別注意。

忘記服藥怎麼辦？

1. 若您發現忘了服藥時，請盡速服藥。
2. 若已經很接近下一次服藥時間，請跳過這一次，到下次服藥時間再服用當次的藥。
3. 切記不可一次服用雙倍的藥量。

可能的副作用

1. 每一種藥都有副作用，若有以下情形，請您不用過於擔心：口乾、食慾不振、頭痛、排尿障礙。
2. 當上述的症狀若持續且加重，請立即就醫！

保存方法

1. 本藥品貯放於室溫乾燥處，勿置於陽光直射處或車內，以免潮濕或高溫造成藥品變質。
2. 避免放在孩童可以取得的場所。
3. 若藥品超過保存期限請丟棄。
4. 勿將您的藥物提供給他人使用。