

拔牙流血不止，竟是血友病？

[發表醫師] :王錦莉 醫師(小兒科)

[發布日期] :2001/9/1

病例：張小弟弟，今年八歲。日前因牙齒疼痛，前往牙科就診。因該蛀牙嚴重且為乳齒，故決定施予拔牙治療。術後仍不斷有血水由牙齦滲出，故轉至小兒血液科門診檢查，後診斷為輕型血友病。

血友病是一種凝血病變，乃是因為缺乏凝血因子所造成的。患者主要是以凝血異常來表現，出血情形是比較緩慢的，常是以皮下深部或肌肉內血腫、關節血腫甚至腹腔內或腦出血為主。此與血小板異常造成的出血傾向不同，其是以出血點、紫斑或瘀青來表現。血友病為遺傳性疾病，屬於性聯遺傳，所以男性比較容易發生。而凝血因子缺乏程度的不同，其臨床表現也有差別。輕型的患者，平時與正常人無異，但有受傷時，比較不易止血。一般不需要治療，只有在接受手術或大傷害時，才需要補充凝血因子。而重型患者，稍有碰撞，皮下內部則因無法凝血，會慢慢滲血造成血腫，若發生在關節，將來可能會有關節變形的後遺症，甚至行動不便。若發生在腦部，則有顱內出血的可能性。故需立即補充凝血因子適時止血，才能減少病變發生。目前國內的血漿製品有新鮮冷凍血漿、冷凍沉澱品以及純化的第八和第九因子。都有經過篩檢且加熱處理，所以因輸血造成的病毒感染，機會已大幅降低，患者可以安心使用。而最重要的是做好優生保健預防措施，故女性血友病帶原者，在懷孕初期，可藉由絨毛膜穿刺檢查，抽取胎兒血

液，測量凝血因子的數量，再決定是否生下胎兒，以避免產下重型患者，造成家庭和社會負擔。

!!健康文章內文主要提供民眾降低對疾病因不了解產生之不安和恐懼，但不可取代實際的醫療行為，所以身體如有不適請您前往醫院就醫治療。