

※辨太陽病脈證并治中篇-湯劑 7

桂枝甘草湯方：桂枝 四兩 炙甘草 二兩。

上二味，以水三升煮，取一升，去滓，頓服。

〔集解〕：

柯琴曰：汗出多，則心液虛，中氣餒，故悸。又手自冒，則外有所衛，得按，則內有所依，如此不堪之狀，望之而知其為虛矣。桂枝本榮分藥，得麻黃則令榮氣外發而為汗，從辛也；得芍藥則收斂榮氣而止汗，從酸也；得甘草則補中氣而養血，從甘也。故此方以桂枝為君，獨任甘草為佐，以補陽氣，生心液，甘溫相得，斯氣血和而悸自平。不須附子者，以汗雖多，而未至於亡陽；不須芍藥者，以汗已止，而嫌其斂陰也。

※辨太陽病脈證并治中篇-湯劑 8

茯苓桂枝甘草大棗湯方

茯苓 半斤 桂枝 四兩 甘草 炙，一兩 大棗 擘，十五枚。

上四味，以甘瀾水一斗，先煮茯苓，減二升，內諸藥，煮取三升，去滓，溫服一升，日三服。

〔作甘瀾水法〕：

取水二斗，置大盆內，以杓揚之，水上有珠子五、六千顆相逐，取用之。

〔方解〕：

此方即苓桂朮甘湯，去白朮、加大棗、倍茯苓也。

彼治心下逆滿，氣上衝胸。此治臍下悸，欲作奔豚。蓋以水停中焦，故用白朮；水停下焦，故倍茯苓。臍下悸，是邪上干心也，其病由汗後而起，自不外乎桂枝之法，仍以桂枝、甘草補陽氣，生心液，倍加茯苓以君之，專伐腎邪，用大棗以佐之，益培中土，以甘瀾水煎，取其不助水邪也。土強自可制水，陽建則能禦陰，欲作奔豚之病，自潛消而默化矣。若已作奔豚，腎陰邪盛，又非此藥所能治，則嘗從事乎桂枝加桂湯

法矣。

※辨太陽病脈證并治中篇-湯劑 9

桂枝去桂加茯苓白朮湯方

於桂枝湯方內去桂，加茯苓、白朮各三兩，餘依桂

枝湯法煎服。小便利則愈。

〔按〕：

去桂去芍之義，詳見上條經文下正誤文內。

〔方解〕：

曰：餘依桂枝湯法煎服，謂依桂枝湯法取汗也。小便利則愈，謂飲
病必輸水道始愈也。此方即苓桂朮甘湯，而有生薑、大棗，其意專在解
肌，利水次之，故用生薑、大棗佐桂枝以通津液取汗也。苓桂朮甘湯不
用生薑、大棗，而加茯苓，其意專在利水，扶陽次之，故倍加茯苓，君
桂枝，於利水中扶陽也，所以方後不曰依服桂枝湯法也。

※辨太陽病脈證并治中篇-湯劑 10

茯苓桂枝白朮甘草湯方

茯苓 四兩 白朮 二兩 桂枝 三兩 甘草 炙，二兩。

上四味，以水六升，煮取三升，去滓，分溫三服。

〔方解〕：

身為振振搖者，即戰振身搖也；身振振欲擗地者，即戰振欲墮於地
也。二者皆為陽虛失其所恃。一用此湯，一用真武者？蓋真武救青龍之
誤汗，其邪已入少陰，故主以附子，佐以生薑、苓、朮，是壯裏陽以制
水也。

此湯救麻黃之誤汗，其邪尚在太陽，故主以桂枝，佐以甘草、苓、
朮，是扶表陽以滌飲也。至於真武湯，用芍藥者，裏寒陰盛，陽衰無依，

於大溫大散之中，若不佐以斂陰之品，恐陰極格陽，必速其飛越也，此湯不用芍藥者，裏寒飲盛，若佐以酸斂之品，恐飲得酸，反凝滯不散也。

※辨太陽病脈證并治中篇-湯劑 11

梔子豉湯方

梔子 十四枚，擘 香豉 四合，綿裹。

上二味，以水四升，先煎梔子，得二升半，內豉，煎取一升半，去滓，分為二服，溫進一服，得吐者，止後服。

※辨太陽病脈證并治中篇-湯劑 12

梔子甘草豉湯方

於梔子豉湯方內，加入甘草二兩，餘依前法，得吐，

止後服。

梔子生薑豉湯方

於梔子豉湯方內，加生薑五兩，餘依前法，得吐，

止後服。