

※辨可下病脈證篇-條文 8

下利脈反滑，當有所去，下乃愈，宜大承氣湯。

〔註〕：

此承上條互發其義，以詳其脈也。下利脈反滑，是證虛、脈實不相宜也。若其人形氣如常，飲食如故，乃有當去之積未去也，下之乃愈，宜大承氣湯。

〔集註〕：

程應旆曰：滑為實，故可行通因通用之法。

※辨可下病脈證篇-條文 9

病腹中滿痛者，此為實也，當下之，宜大承氣湯。

〔註〕：

腹中不滿而痛者，病或屬虛，若滿而痛，則為實矣，當下之，宜大承氣湯。

〔集註〕：

張璐曰：腹中既滿且痛，為實結無疑，急須下之。

程應旆曰：病腹中滿痛，雖在陰經，亦可下，不必其為陽明矣。

※辨可下病脈證篇-條文 10

傷寒後脈沈。沈者，內實也，下之解，宜大柴胡湯。

〔註〕：

傷寒後不解，脈沈，沈而有力者，內實也，宜以下解。然其人必午後小有潮熱，故取大柴胡兩解之也。

※辨可下病脈證篇-條文 11

脈雙弦而遲者，必心下硬，脈大而緊者，陽中有陰

也，可下之，宜大承氣湯。

〔註〕：

雙弦，謂左關、右關皆見弦脈也。左關脈弦，肝本脈也；右關脈弦，木刑土也。弦者，飲也。遲者，寒也。心下硬者，是肝邪挾寒飲而傷胃，故不可下，乃生薑瀉心湯證也。若脈大按之緊，是陽有餘而陰亦實也，乃有餘之硬，非胃傷者比，故可下之，宜大承氣湯也。