

醫生說我是 Rh 陰性的血型，是好、是壞、怎麼辦？

[返回 醫療衛教](#)

發表醫師 婦產科團隊

發佈日期 2010/03/16

Rh 陰性的血型在中國人的人口不到百分之一，屬罕見的血型。Rh 血型與 ABO 血型一樣可以分為數個不同的抗原，簡單的分類就是以陽性和陰性來表示。但是嚴格來說，Rh 陰性還可以再分為數個不同的抗原。以白種人為例，大多是以抗原性比較強的“D 抗原”為主，而東方人則以其他抗原性較弱的型態存在。因此幾年前即有國內專家學者提議；國內 Rh 陰性的婦女在分娩後不似白種人必須施打抗 RhD 免疫球蛋白。雖是如此，國內的醫療院所還是會在產後，依照常規的幫產婦施打免疫球蛋白。

若是第二胎的產婦，前一胎在產後應該已有注射抗 RhD 免疫球蛋白。如果不確定，可以回到原生產醫療院所查詢。如果已有注射過，此胎即可免除。萬一沒有，則有幾種可能的狀況：1、立即以預防性的補打一針(研究報告建議在懷孕 28 週和 34 週時各施打一次)或是 2、不理會，但可能的話儘早分娩(前提是現在已經懷孕 37 週多了，同時胎兒並未出現任何異常)3、檢測母體血液中是否已有抗 RhD 抗体出現。或 4、抽臍帶血驗胎兒的血型。胎兒如果與母親同屬於 Rh 陰性的話則不構成問題。反之如果胎兒屬於 Rh 陽性(多數的案例皆是如此)，而且母體的免疫系統已被激化，則母體會製造抗體來對抗胎兒的血球。因此胎兒的血球會被破壞而形成溶血。嚴重者會造成胎死腹中，挽救的方法就是子宮內輸血給胎兒和即早分娩。最後 5、抽檢父親的血型是否一樣為 Rh 陰性，如果是則胎兒血型當然也會是 Rh 陰性。

Rh 血型是遺傳來的，這種血型沒有所謂的好壞，也沒有後遺症。只是 Rh 陰性血型的族群少，會有影響的是在於需要輸血時和 Rh 陰性的婦女在分娩後，須要多一道程序而已。

健康文章內文主要提供民眾降低對疾病因不了解產生之不安和恐懼，但不可取代實際的醫療行為，所以身體如有不適請您前往醫院就醫治療。