

※刪補名醫方論卷七-方劑 143

三物白散

治傷寒，寒實結胸無熱證者，及胸膈寒實痰水內結

等證。

桔梗 三分 貝母 三分 巴豆 去皮，熬黑，研如泥，一分。上杵二味為末，

納巴豆於白中杵之，以白飲合服。強人一錢，羸者減之。病在膈上必吐，

在膈下必痢。不痢進熱粥一杯，痢過不止，進冷粥一杯。

〔註〕：

是方治寒實痰水結胸，極峻之藥也。君以巴豆極辛極烈，攻寒逐水，斬關奪門，所到之處無不破也。佐以貝母開胸之結。使以桔梗為之舟楫，載巴豆搜逐胸邪。

膈上者必吐，膈下者必痢，使其邪悉盡無餘矣。然惟知任毒以攻邪，不量強羸，鮮能善其後也，故羸者減之。

不利進熱粥，利過進冷粥。蓋巴豆性熱，得熱則行，得冷則止，不用水而用粥者，藉穀氣以保胃也。

※刪補名醫方論卷七-方劑 144

大黃黃連瀉心湯

治傷寒表解，心下痞，按之不軟，其脈關上浮者。

大黃 二兩 黃連 一兩。上二味，以麻沸湯二升漬之，須臾絞去滓，

分溫再服。

〔註〕：

痞硬虛邪而用大黃、黃連，能不起後人之疑耶？仲景使人疑處，正是妙處。蓋因後人未嘗細玩，不得其法，皆煎而服之，大悖其旨矣。觀乎用氣薄之麻沸湯漬大黃、黃連，須臾去滓，僅得其無形之氣，不重其有形之味，是取其氣味俱薄，不大瀉下。雖曰攻痞，而攻之之妙義無窮也。

※刪補名醫方論卷七-方劑 145

附子瀉心湯

治傷寒表解，心下痞，惡寒汗出者。

大黃 二兩 黃連 一兩 黃芩 一兩 附子 炮去皮，別煮汁，一枚。上四味，

切三味，以麻沸湯二升漬之，須臾絞去滓，納附子汁，分溫再服。

〔註〕：

心下硬痛，結胸也；硬而不痛，心下痞也。惡寒而復汗出，非表不解，乃表陽虛也。故以大黃、黃連、黃芩瀉痞之熱，附子溫表之陽，合內外而治之。其妙在以麻沸湯漬三黃，須臾絞去滓，內別煮附子汁，義在瀉痞之意輕，扶陽之意重也。

※刪補名醫方論卷七-方劑 146

甘草瀉心湯

治傷寒中風，醫反下之，其人不痢，日數十行，穀

不化，腹中雷鳴，心下痞硬而滿，乾嘔心煩不得安。

醫見心下痞，謂病不盡，復下之，其痞益甚，止非結

熱，但以胃中虛，客氣上逆，故使硬也。

甘草 四兩 黃芩 三兩 黃連 一兩 乾薑 三兩 半夏 洗，半升 大棗

擘，十二枚。上六味，以水一斗，煮取六升，去滓再煎，取三升，溫服一

升，日三服。

〔註〕：

毋論傷寒、中風，表未解，總不可下，醫反下之，因而成痞。其人下痢日數十行，水穀不化，腹中雷鳴者，誤下胃中空虛也。心下痞硬而滿，乾嘔心煩不得安者，乘虛客邪上逆也。醫見心下痞硬，謂下之不盡，又復下之，其痞益甚。但此非結熱之痞，亦非寒結之痞。乃乘胃空虛，客氣上逆，陽陷陰凝之痞也。方以甘草命名者，取和緩之意。用甘草、大棗之甘溫，補中緩急，治痞之益甚。半夏之辛，破客逆之上從。芩、連瀉陽陷之痞熱，乾薑散陰凝之痞寒。緩急破逆，瀉痞寒熱，備乎其治矣。

※刪補名醫方論卷七-方劑 147

生薑瀉心湯

治傷寒汗出解後，胃中不和，心下痞硬，乾噎食臭，

脅下有水氣，腹中雷鳴下痢者。

甘草 炙，三兩 人參 三兩 乾薑 一兩 半夏 洗，半升 黃芩 三兩 黃

連 一兩 生薑 切，四兩 大棗 擘，十二枚。上八味，以水一斗，煮取六升，

去滓再煎，取三升，溫服一升，日三服。

〔註〕：

傷寒汗出之後，餘邪轉屬陽明，心下痞滿硬痛不大便者，此其人胃素燥熱，因而成實，攻之可也。今其人平素胃虛，兼脅下有水氣，即不誤下，餘熱乘虛入裡，結成痞硬不痛，胃虛不能消化水穀，則乾噎食臭也。胃中寒熱不和，則腹中雷鳴下利也。名生薑瀉心湯者，其義重在散水氣之痞也。生薑、半夏散脅下之水氣。人參、大棗補中州之土虛。乾薑、甘草以溫裡寒。黃芩、黃連以瀉痞熱。備乎虛水寒熱之治，胃中不和下利之痞，未有不癒者也。

※刪補名醫方論卷七-方劑 148

半夏瀉心湯

治傷寒五、六日，嘔而發熱，柴胡證具，而以他藥

下之，但滿不痛，心下痞者。

半夏 洗，半升 黃芩 三兩 乾薑 三兩 人參 三兩 黃連 一兩 甘草

炙，三兩 大棗 擘，十二枚。上七味，以水一斗，煮取六升，去滓再煎，取

三升，溫服一升，日三服。

〔集註〕：

王又原曰：傷寒五、六日，柴胡證具，而以他藥下之成痞。即用小柴胡湯，以乾薑易生薑，以黃連易柴胡。彼以和表裡，此以徹上下。而必推半夏為君者，痞從嘔得來，半夏之辛以破結而止嘔也。