

肘後備急方

治卒得鬼擊方第四

原文

鬼擊之病，得之無漸卒著，如人力刺狀，胸脅腹內，絞急切痛，不可抑按，或即吐血，或鼻中出血，或下血，一名鬼排。治之方。

灸鼻下人中一壯，立愈。不瘥，可加數壯。

又方 升麻、獨活、牡桂，分等。末，酒服方寸匕，立愈。

又方 灸臍下一寸，二壯。

又方 灸臍上一寸，七壯，及兩踵白肉際，取瘥。

又方 熟艾如鴨子大，三枚。水五升，煮取二升，頓服之。

又方 鹽一升，水二升。和攪飲之，並以冷水之。勿令即得吐，須臾吐，即瘥。

又方 以粉一撮，著水中攪。飲之。

又方 以淳酒吹納兩鼻中。

又方 斷白犬一頭，取熱犬血一升。飲之。

又方 割雞冠血以瀝口中，令一咽，仍破此雞以心下，

冷乃棄之於道邊。得烏雞彌佳，妙。

又方 牛子屎一升。酒三升，煮服之。大牛亦可用之。

又方 刀鞘三寸。燒末，水飲之。

又方 燒鼠屎末服，如黍米不能飲之，以少水和納口中。

又有諸丸散，並在備急藥條中。今巫實見人忽有被鬼神所擺拂者，或犯其行伍，或遇相觸突，或身神散弱，或愆負所貽，輕者因而獲免，重者多見死亡，猶如燕簡輩事，非為虛也，必應死，亦不可，要自不得不救爾。

註釋

附方 《古今錄驗》療妖魅貓鬼病患不肯言鬼方。鹿角屑搗散，以水服方寸匕，即言實也。