

※水氣病脈證并治第十五 340

越婢湯方：

麻黃 六兩 石膏 半斤 生薑 三兩 甘草 二兩 大棗 十五枚

上五味，以水六升，先煮麻黃，去上沫，內諸藥，煮取三升，分溫三服。惡風者，加附子一枚，炮。風水，加朮四兩。

※水氣病脈證并治第十五 341

皮水為病，四肢腫，水氣在皮膚中，四肢聶動聶者，

防己茯苓湯主之。

〔註〕：

此承皮水互詳其證，以明其治也。皮水之病，是水氣相搏，在皮膚之中，故四肢聶聶動也，以防己茯苓湯補衛通榮，祛散皮水也。

〔集註〕：

沈明宗曰：此邪在皮膚而腫也。風入於衛，陽氣虛滯，則四肢腫。經謂結陽者腫四肢，即皮水也。皮毛受風氣虛而腫，所謂水氣在皮膚中，邪正相搏，風虛內鼓，故四肢聶聶而動，是因表虛也。

蓋三焦之氣，同入膀胱，而行決瀆，今水不行，則當使小便利而病得除。故防己、茯苓除濕而利水，以黃耆補衛而實表，表實則邪不能容，甘草安土而制水邪，桂枝以和榮衛，又行陽化氣而實四末，俾風從外出，水從內洩矣。

※水氣病脈證并治第十五 342

防己茯苓湯方：

防己 三兩 黃耆 三兩 桂枝 三兩 茯苓 六兩 甘草 三兩

上五味，以水六升，煮取二升，分溫三服。

※水氣病脈證并治_{第十五 343}

裏水，越婢加朮湯主之，甘草麻黃湯亦主之。

〔按〕：

裏水之「裏」字，當是「皮」字，豈有裏水而用麻黃之理，閱者自知，是傳寫之訛。

〔註〕：

皮水表虛有汗者，防己茯苓湯固所宜也。若表實無汗、有熱者，則當用越婢加朮湯；無熱者，則當用甘草麻黃湯發其汗，使水外從皮去也。

※水氣病脈證并治_{第十五 344}

越婢加朮湯方：於越婢湯中加朮（四兩）。

甘草麻黃湯方：甘草 二兩 麻黃 四兩

上二味，以水五升，先煮麻黃，去上沫，內甘草，煮取三升，溫服一升，重覆汗出，不汗再服，慎風寒。

※水氣病脈證并治_{第十五 345}

厥而皮水者，蒲灰散主之。

〔按〕：

「厥而」二字，當是衍文。

〔註〕：

水在皮膚，浸淫日久，必然腐潰而出水也，當以蒲灰散敷之，以燥水也。（蒲灰散方見消渴中）