

糖祿®錠 Glucobay® 50 mg

藥品成分名：Acarbose

藥品外觀：白色，圓扁形，錠劑；大小：0.7 公分；

標記：[BAYER][G，50]

作用

糖祿®錠用來治療第二型糖尿病患者，並藉由抑制腸道分解雙醣、寡醣及多醣，來延緩飯後血糖上升及降低您血中葡萄糖含量，使血糖維持在正常值。

用法

1. 請遵照醫生指示服藥。
2. 通常於三餐進食時與第一口飯同時間服用，或服用後立即用餐。
3. 不可因為覺得沒有不舒服的症狀而自行停藥。

注意事項

- 1.若您有以下情形，請告知您的醫(藥)師。
 - (1) 若您是孕婦、哺乳中婦女、有肝腎方面疾病、有腸道疾病者。
 - (2) 若您對**糖祿®錠**過敏。
2. 配合醫生指示控制飲食和適量運動才能有效控制

糖尿病症狀，有助於您的健康。

忘記服藥時該怎麼辦？

1. 若您發現忘了服藥時，請盡速服藥。
2. 若已經很接近下一次服藥時間，請跳過這一次，到下次服藥時間再服用當次的藥。
3. 切記不可一次服用雙倍的藥量。

可能的副作用

1. 每一個藥都會有副作用，若您出現腸胃不適、腹瀉、脹氣等，請勿驚慌。若上述症狀持續且加重，請聯絡您的醫師。
2. 若發生下述情形請立即就醫：眼睛或皮膚顏色變黃。
3. 服用**糖祿®錠**可能造成低血糖症狀請小心(請見低血糖症狀處理方法)。

保存方法

1. 請儲存於緊密容器中，於室溫乾燥處、避光保存。
2. 避免放在孩童可以取得的場所。
3. 若藥品超過保存期限請丟棄。
4. 勿將您的藥物提供給他人使用。

發生低血糖該怎麼辦?

症狀：

顫抖、心跳加快、冒冷汗、注意力無法集中、異常飢餓、視力模糊、虛弱無力。

處理方式：

1. 血糖值小於70 mg/dl：立即服用120-180 毫升果汁或糖果8-10 顆；15-20 分鐘後測量血糖值。
2. 血糖值小於50 mg/dl：立即服用180-250 毫升果汁或糖果10-15 顆；15-20 分鐘後測量血糖值。
3. 若症狀沒有改善，請立即與您的醫師聯絡。
4. 當低血糖症狀發生時請勿駕車，以免發生危險。

發生高血糖該怎麼辦?

症狀：

例如異常口渴、疲倦、皮膚乾燥、呼吸困難、頻尿、沒胃口等。

處理方式：

請測量血糖值並立即與您的醫師聯絡。