

※胸痺心痛短氣病脈證并治 第九 160

胸痺，不得臥，心痛徹背者，栝蒌薤白半夏湯主之。

〔註〕：

上條胸痺，胸背痛，尚能臥，以痛微而氣不逆也。

此條心痛徹背，不得臥，是痛甚而氣上逆也，故仍用前方，大加半夏以降逆也。

〔集註〕：

尤怡曰：胸痺不得臥，是胸中痛甚，肺氣上而不下也。心痛徹背，是氣閉塞而前後不通故也，其痺為尤甚矣。所以然者，有痰飲以為之援也。

※胸痺心痛短氣病脈證并治 第九 161

栝蒌薤白半夏湯方：

栝蒌實 一枚，搗 薤白 三兩 半夏 半升 白酒 一斗。

上四味，同煮取四升，溫服一升，日三服。

〔集解〕：

魏荔彤曰：用半夏之苦，以開鬱行氣。痛甚則結甚，故減薤白之濕，用半夏之燥，更能使膠膩之物，隨湯而蕩滌也。日三服，亦從上治者，應徐取、頻服也。

※胸痺心痛短氣病脈證并治 第九 162

心痛徹背，背痛徹心，烏頭赤石脂圓主之。

〔註〕：

上條心痛徹背，尚有休止之時，故以栝蒌薤白白酒加半夏湯，平劑

治之。此條心痛徹背，背痛徹心，是連連痛而不休，則為陰寒邪甚，浸浸乎陽光欲熄，非薤白白酒之所能治也，故以烏頭赤石脂圓主之。方中烏、附、椒、薑一派大辛大熱，別無他顧，峻逐陰邪而已。

〔集註〕：

李杲曰：心痛在內而徹背，則內而達於外矣；背痛在外而徹心，則外而入於內矣。故既有附子之溫，而復用烏頭之迅，佐乾薑行陽，大散其寒，佐蜀椒下氣，大開其鬱，恐過於大散大開，故復佐赤石脂入心，以固澀而收陽氣也。

※胸痺心痛短氣病脈證并治 第九 163

赤石脂圓方：

蜀椒 一兩，一法二分 烏頭 一分，炮 附子 半兩，炮，一法一分 赤石脂 一

兩，一法一分 乾薑 一兩，一法一分。

上五味，末之，蜜丸如桐子大。先食服一丸，日三服，不知稍加服。

※胸痺心痛短氣病脈證并治 第九 164

胸痺，緩急者，薤苡附子散主之。

〔註〕：

緩急者，謂胸痺痛而時緩時急也。當審其緩急而施治，若緩而不急者，以栝蒌薤白白酒湯主之。今時緩時急，故以薤苡附子散，急通痺氣，以迅掃陰邪也。