

[Famvir 250mg/tab 抗瀉兒 錠] - [Famciclovir]

藥師

藥劑部藥師 發佈日期

2011/10/10

<藥物效用>

治療病毒感染

<服藥指示>

- 1.請依照醫師的指示，絕對不可自行停藥或更改劑量。
- 2.盡可能保持每日於相同時間服藥。忘記服藥時，只要服用下次的藥。不可一次服用兩次的藥量。

<注意事項>

- 1.不可自行增減藥量、更改用法或停藥
- 2.若出現皮膚紅疹或癢，請立即與醫師或藥師聯絡。

<其他注意事項>

- 1.若您計畫(已)懷孕、哺乳，請告知您的醫(藥)師。
- 2.如果您對本藥成分過敏，請告知您的醫(藥)師。
- 3.服用此藥時，應該主動告知您的醫(藥)師所有您同時服用的其他藥物〈包含處方藥、非處方藥及中藥〉。

<副作用>

- 1.每一種藥都有副作用，若有以下情況，請勿太驚慌：
腹瀉、頭痛、噁心、嘔吐、脹氣、痛經、紅斑
- 2.上述症狀若持續且加重，請立刻聯絡您的醫師。

<藥品外觀>

白色，圓凸形，錠劑；大小：1.0 公分；標記：[FV][250]