

<藥物效用>

甲狀腺素，治療甲狀腺功能不足。

<服藥指示>

1. 請按照醫師指示服藥。
2. 請於早餐前空腹服用，吸收效果最佳。
3. 忘記服藥請儘快服用，若已接近下次服藥時間，只要服用下次的藥，不可一次服兩次藥量。

<注意事項>

1. 若對此藥有過敏現象，請停止服用並告知您的醫師或藥師。
2. 甲狀腺素與某些藥品會互相影響，若您有服用下列藥品，請主動告知您的醫師：抗凝血劑、抗癲癇劑、強心配糖體、口服避孕藥、交感神經作用劑、三環抗憂鬱劑等。
3. 若您服用甲狀腺素期間有懷孕或哺乳的計畫，請主動告知您的醫師。
4. 若您患有高血壓、心肌梗塞、糖尿病、尿崩症、甲狀腺功能亢進、腎上腺功能不足、全腦垂體功能不足等疾病，請主動告知您的醫師。
5. 保存藥品時請置於 25℃ 以下，避免光線直射。

<副作用>

1. 每一種藥都有副作用，甲狀腺素於治療劑量下很少發生副作用。
2. 若服用過量，可能出現下列症狀：頭痛、緊張、出汗、臉紅、腹瀉、嘔吐、體重減輕、肌肉無力、胸痛、心跳加速、月經週期改變等。若出現上述症狀，請立即與您的醫師聯絡。

健康文章內文主要提供民眾降低對疾病因不了解產生之不安和恐懼，但不可取代實際的醫療行為，所以身體如有不適請您前往醫院就醫治療。