

※驚悸吐衄下血胸滿瘀血病脈證并治_{第十二 245}

病人胸滿唇痿，舌青口燥，但欲漱水不欲嚥，無寒

熱，脈微大來遲，腹不滿，其人言我滿，為有瘀血。

〔註〕：

表實無汗，胸滿而喘者，風寒之胸滿也；裏實便澇，胸滿煩熱者，熱壅之胸滿也；面目浮腫，胸滿喘不得臥者，停飲之胸滿也；呼吸不快，胸滿太息而稍寬者，氣滯之胸滿也。今病人無寒熱他病，惟胸滿、唇痿、舌青、口燥、漱水不欲嚥，乃瘀血之胸滿也。唇舌，血華之處也，血病不榮，故痿痺色變也。熱在血分，故口燥漱水不欲嚥也。脈微大來遲，陰凝之診，則當腹滿，今腹不滿，詢之其人，言我滿在胸不在腹也，與上如是之證推之，為有瘀血也。

※驚悸吐衄下血胸滿瘀血病脈證并治_{第十二 246}

病者如熱狀，煩滿，口乾燥而渴，其脈反無熱，此

為陰伏，是瘀血也，當下之。

〔註〕：

此承上文互詳證脈，以明其治也。如熱狀，即所謂心煩胸滿，口乾燥渴之熱證也。其人當得數大之陽脈，今反見沉伏之陰脈，是為熱伏於陰，乃瘀血也。血瘀者當下之宜桃核承氣、抵當湯、丸之類也。

〔集註〕：

李彥曰：血瘀內無實熱，故外證但如熱狀，而其脈不數疾，反無熱也。煩滿者，血瘀經氣不舒；燥渴者，血瘀津液不布。血屬陰，瘀則脈伏于內，故為陰伏。當下之，以去瘀生新也。

驚悸吐衄下血胸滿瘀血病脈證并治_{第十二}

下血，先便後血，此遠血也，黃土湯主之。下血，先血後便，此近血也，赤小豆當歸散主之。

〔註〕：

先便後血，此遠血也，謂血在胃也，即古之所謂結陰，今之所謂便血也。先血後便，此近血也，謂血在腸也，即古之所謂腸澼為痔下血，今之所謂藏毒，腸風下血也。一用黃土湯以治結陰之血，從溫也；一用赤小豆當歸散，以治藏毒之血，從清也。

〔集註〕：

趙良曰：腸胃陽明經也，以下血言，胃居大腸之上，若聚於胃，必先便後血，去肛門遠，故曰遠血。若聚大腸，去肛門近，故曰近血，故治遠血黃土湯主之，治近血赤小豆當歸散主之。

驚悸吐衄下血胸滿瘀血病脈證并治 第十二 247

下血，先便後血，此遠血也，黃土湯主之。下血，

先血後便，此近血也，赤小豆當歸散主之。

〔註〕：

先便後血，此遠血也，謂血在胃也，即古之所謂結陰，今之所謂便血也。先血後便，此近血也，謂血在腸也，即古之所謂腸澼為痔下血，今之所謂藏毒，腸風下血也。一用黃土湯以治結陰之血，從溫也；一用赤小豆當歸散，以治藏毒之血，從清也。

〔集註〕：

趙良曰：腸胃陽明經也，以下血言，胃居大腸之上，若聚於胃，必先便後血，去肛門遠，故曰遠血。若聚大腸，去肛門近，故曰近血，故治遠血黃土湯主之，治近血赤小豆當歸散主之。